

**Утверждено
Приказ Министерства
Здравоохранения Украины
10.10.2014 №715
Регистрационное удостоверение
№ UA 10156/01/01**

**ИНСТРУКЦИЯ
для медицинского применения лекарственного средства
СОРБЕКС®**

Состав:

действующее вещество: 1 капсула содержит угля активированного 0,25 г;
вспомогательные вещества: желатин, железа оксид черный (E172), бриллиантовый черный (E 151).

Лекарственная форма. Капсулы.

Основные физико-химические свойства: тело капсулы черного цвета, крышечка черного цвета с нанесенной маркировкой «SORBEX» белым цветом или без нанесения такой маркировки. Содержимое капсулы - сыпучий порошок черного цвета.

Фармакологическая группа.

Энтеросорбенты. Код АТХ А07В А01.

Фармакологические свойства.

Фармакодинамика. Энтеросорбент СОРБЕКС® оказывает детоксикационное действие. Активное вещество лекарственного средства СОРБЕКС® - уголь активированный растительного происхождения с развитой активной поверхностью, способен адсорбировать газы и жидкие токсичные соединения, которые образуются и накапливаются в избыточном количестве при острых и хронических заболеваниях или попадают в организм извне.

Фармакокинетика. Уголь активированный является нетоксичным инертным веществом. Во время пребывания в организме он не претерпевает химических изменений и метаболических превращений, не всасывается из просвета кишечника, не попадает за пределы желудочно-кишечного тракта, не определяется в любых концентрациях в биологических жидкостях и выводится из организма через кишечник.

Клинические характеристики.

Показания.

СОРБЕКС® применяют:

- При хронических отравлениях бытовыми и промышленными токсинами (алкалоидами, солями тяжелых металлов, другими веществами), продуктами питания, лекарственными препаратами, алкогольно-пищевых перегрузках с целью уменьшения поглощения, предупреждения дальнейшего всасывания и ускорения удаления из организма токсических веществ;

- При проживании в неблагоприятных экологических условиях или воздействии вредных производственных факторов, изменении обычного образа питания во время отпуска, командировки, путешествий;

в качестве вспомогательной терапии:

- При расстройствах и инфекционных заболеваниях желудочно-кишечного тракта (диспепсия, метеоризм, кишечные инфекции, острые и хронические вирусные гепатиты);

в качестве вспомогательной терапии:

- При расстройствах и инфекционных заболеваниях желудочно-кишечного тракта (диспепсия, метеоризм, кишечные инфекции, острые и хронические вирусные гепатиты);

- При заболеваниях, сопровождающихся синдромом эндогенной интоксикации: острых и хронических поражениях печени, почек, аллергических, аутоиммунных и онкологических заболеваниях, а также при повышенном содержании холестерина.

Противопоказания.

Индивидуальная повышенная чувствительность к сорбенту. Язвенные и эрозивные поражения желудочно-кишечного тракта в стадии обострения, желудочно-кишечное кровотечение, кишечная непроходимость.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.

Благодаря адсорбирующим свойствам уголь активированный способен уменьшать эффективность лекарственных средств, которые принимают одновременно с ним. Поэтому при сопутствующей фармакотерапии СОРБЕКС® принимают за 1 - 1,5 часа до или после приема других лекарственных средств.

При условии соблюдения способа применения препарат можно применять в комплексной терапии другими лекарственными средствами.

Особенности применения.

Женщинам, которые принимают противозачаточные препараты, рекомендуется в период лечения СОРБЕКС® использовать другие противозачаточные средства.

Одновременный прием препарата и пищи уменьшает адсорбционную активность лекарственного средства, поэтому СОРБЕКС® принимают за 1 - 1,5 часа до или после приема пищи.

Длительный прием (более 15 суток) может сопровождаться нарушениями всасывания и вызвать в организме дефицит витаминов, гормонов, жиров, белков, что требует соответствующей лекарственной или алиментарной коррекции.

Кал после приема лекарственного средства СОРБЕКС® окрашивается в черный цвет.

При наличии гиповитаминоза, которым может сопровождаться длительное применение активированного угля, необходимо назначать поливитамины.

Применение в период беременности или кормления грудью.

Данные о негативном влиянии лекарственного средства СОРБЕКС® в период беременности и кормления грудью не отмечались.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.

СОРБЕКС® не противопоказан при управлении автотранспортом или другими механизмами.

Способ применения и дозы:

При метеоризме и диспепсии взрослым применять по 1 - 3 капсулы 3 - 4 раза в сутки.

При отравлениях и интоксикациях взрослым применять по 2 - 6 капсул 3 раза в сутки.

Детям в возрасте старше 7 лет применять по 1 - 3 капсулы 3 - 4 раза в сутки.

Препарат применять по 1,5 - 2 часа до или после еды или приема лекарственных средств, запивая водой.

Курс лечения при острых состояниях составляет до 3 - 5 дней, при хронических заболеваниях, обусловленных эндогенными интоксикациями, - до 10 - 15 дней.

Дети.

Детям до 7 лет нецелесообразно применять препарат в данной лекарственной форме.

Передозировка.

Значительное превышение максимальных разовых доз может привести к побочному действию: тошнота, рвота, запоров.

Побочные реакции.

Возможны тошнота, рвота и проявления повышенной чувствительности. Длительное применение может сопровождаться расстройствами функций кишечника (диарея, запор), легко устраняются прекращением приема препарата и назначением симптоматической терапии. Длительный прием (более 15 суток) может сопровождаться нарушениями всасывания и вызвать в организме дефицит витаминов, гормонов, жиров, белков, что требует соответствующей лекарственной или алиментарной коррекции.

При проявлении каких-либо побочных эффектов, о которых не указано в инструкции по применению, срочно сообщите об этом врачу!

Срок годности. 3 года.**Условия хранения.**

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° С. Хранить отдельно от веществ и материалов, которые выделяют газы и пары.

Хранить в недоступном для детей месте!

Упаковка.

Капсулы по 0,25 г;

по 10 капсул в блистере, № 10 или № 20 в пачке;

по 2 капсулы в блистере, № 200 в пачке.

Категория отпуска.

Без рецепта.

Производитель.

ООО «ВАЛАРТИН ФАРМА».

Местонахождение производителя и адрес его места осуществления деятельности.

Украина, 08130, Киевская область, Киево-Святошинский р-н, с. Чайки, ул. Грушевского, 60.

Заявитель.

ООО «ВАЛАРТИН ФАРМА».

Местонахождение производителя и/или представителя заявителя

Украина, 08130, Киевская область, Киево-Святошинский р-н, с. Чайки, ул. Грушевского, 60.