

SORBEX® Классический инструкция

Состав

действующее вещество: 1 капсула содержит угля активированного 0,25 г

вспомогательные вещества: желатин, железа оксид черный (E172), бриллиантовый черный (E 151).

Лекарственная форма

Капсулы.

Основные физико-химические свойства: тело капсулы черного цвета, крышечка черного цвета с нанесенным маркировкой «SORBEX» белым цветом или без нанесения такой маркировки. Содержимое капсулы — сыпучий порошок черного цвета.

Фармакологическая группа

Энтеросорбенты. Код АТХ А07В А01.

Фармакологические свойства

Фармакологические. Энтеросорбент Сорбекс® оказывает детоксикационное действие.

Активное вещество лекарственного средства Сорбекс® — уголь активированный растительного происхождения с развитой активной поверхностью, способно адсорбировать газы и жидкие токсичные соединения, образующиеся и накапливаются в избыточном количестве при острых и хронических заболеваниях или попадают в организм извне.

Фармакокинетика. Уголь активированный является нетоксичным инертным веществом. Во время пребывания в организме оно не испытывает химических изменений и метаболических превращений, не всасывается из просвета кишечника, не попадает за пределы желудочно-кишечного тракта, не выявляется в любых концентрациях в биологических жидкостях и удаляется из организма через кишечник.

Показания

Сорбекс® применяют:

- при хронических отравлениях бытовыми и промышленными токсинами (алкалоидами, солями тяжелых металлов, другими веществами), продуктами питания, лекарственными препаратами, алкогольно-пищевых перегрузках с целью уменьшения поглощения, предупреждения

дальнейшего всасывания и ускорение удаления из организма токсических веществ;

- при проживании в неблагоприятных экологических условиях или воздействия вредных производственных факторов, изменении обычного образа питания во время отпуска, командировки, путешествий; в качестве вспомогательной терапии:
- при расстройствах и инфекционных заболеваниях желудочно-кишечного тракта (диспепсия, метеоризм, кишечные инфекции, острые и хронические вирусные гепатиты)
- при заболеваниях, сопровождающихся синдромом эндогенной интоксикации: острых и хронических поражениях печени, почек, аллергических, аутоиммунных и онкологических заболеваниях, а также при повышенном содержании холестерина.

Противопоказания

Индивидуальная повышенная чувствительность к сорбента. Язвенные и эрозивные поражения желудочно-кишечного тракта в стадии обострения, желудочно-кишечное кровотечение, кишечная непроходимость.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Благодаря адсорбирующим свойствам уголь активированный способен снижать эффективность лекарственных средств, которые принимают одновременно с ним. Поэтому при сопутствующей фармакотерапии Сорбекс® принимают за 1 — 1,5 часа до или после приема других лекарственных средств.

При условии соблюдения способа применения препарат можно применять в комплексной терапии другими лекарственными средствами.

Особенности применения.

Женщинам, которые принимают противозачаточные препараты, рекомендуется в период лечения Сорбекс® использовать другие противозачаточные средства.

Одновременный прием препарата и пищи уменьшает адсорбционную активность лекарственного средства, поэтому Сорбекс® принимают за 1 — 1,5 часа до или после приема пищи.

Длительный прием (более 15 суток) может сопровождаться нарушениями всасывания и вызвать в организме дефицит витаминов, гормонов, жиров,

белков, требует соответствующей лекарственной или алиментарной коррекции.

Кал после приема лекарственного средства Сорбекс® окрашивается в черный цвет.

При наличии гиповитаминоза, которым может сопровождаться длительное применение угля активированного, необходимо назначать поливитамины.

Применение в период беременности или кормления грудью

Данные о негативном влиянии лекарственного средства Сорбекс® в период беременности и кормления грудью не отличались.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.

Сорбекс® не противопоказан при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.

Способ применения и дозы

При метеоризме и диспепсии взрослым применять по 1 — 3 капсулы 3 — 4 раза в сутки.

При отравлениях и интоксикациях взрослым применять по 2 — 6 капсул 3 раза в сутки.

Детям от 7 лет применять по 1 — 3 капсулы 3 — 4 раза в сутки.

Препарат применять за 1,5 — 2:00 до или после еды или приема лекарственных средств, запивая водой.

Курс лечения при острых состояниях составляет до 3 — 5 дней, при хронических заболеваниях, обусловленных эндогенными интоксикациями, — до 10 — 15 дней.

Дети

Детям до 7 лет нецелесообразно применять препарат в этой лекарственной форме.

Передозировка

Значительное превышение максимальных разовых доз может привести к побочному действию: тошнота, рвота, запоров.

Побочные реакции

Возможны тошнота, рвота и проявления повышенной чувствительности. Длительное применение может сопровождаться расстройствами функций кишечника (диарея, запор), легко устраняются прекращением приема

препарата и назначением симптоматической терапии. Длительный прием (более 15 суток) может сопровождаться нарушениями всасывания и вызвать в организме дефицит витаминов, гормонов, жиров, белков, требует соответствующей лекарственной или алиментарной коррекции.

При проявлении каких-либо побочных эффектов, о которых указано в инструкции по применению, срочно сообщите об этом врачу!

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° С. Хранить отдельно от веществ и материалов, которые выделяют газы и пары.

Хранить в недоступном для детей месте!

Упаковка

Капсулы по 0,25 г

по 10 капсул в блистере, № 10 или № 20 в пачке;

по 2 капсулы в блистере, № 200 в пачке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ООО «ВАЛАРТИН ФАРМА».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 08130, Киевская область, Киево-Святошинский р-н, с. Чайки, ул. Грушевского, 60.

Заявитель

ООО «ВАЛАРТИН ФАРМА».

Местонахождение заявителя и / или представителя заявителя.

Украина, 08130, Киевская область, Киево-Святошинский р-н, с. Чайки, ул. Грушевского, 60.

Торговое наименование. «Сорбекс®».

Активный фармацевтический ингредиент. Уголь активированный.

Фармакотерапевтическая группа. Энтеросорбент. Код АТС 01А07ВА.

Лекарственная форма. Капсулы твердые. 1 капсула содержит угля активированного 0,25 г (250 мг).

